

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 ——

2015年12月

医師・薬剤師・医療関係者の皆様

適正使用のお願い

パーキンソン症候群治療剤・精神活動改善剤
抗A型インフルエンザウイルス剤

アマンタジン塩酸塩錠 50mg「イセイ」
アマンタジン塩酸塩錠 100mg「イセイ」
アマンタジン塩酸塩散 10%「イセイ」
(アマンタジン塩酸塩)

製造販売元

コーアイセイ株式会社
山形市若葉町13番45号

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、抗インフルエンザウイルス薬の服用後に因果関係は不明ではあるものの、異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告されております。

小児・未成年者につきましては、異常行動による転落等の、万が一の事故を防止するための予防的な対応として、以下の点について患者様・ご家族に対してご説明くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

本剤による治療が開始された後は、

- ① “異常行動” の発現のおそれがあること**
- ② 自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮すること**
- ③ また、インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状があらわれるとの報告があるので、上記と同様の配慮が必要であること**

なお、厚生労働省のホームページに「平成27年度 今冬のインフルエンザ総合対策について」を開設し、以下の情報が掲載されておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。

(平成27年度 今冬のインフルエンザ総合対策について)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html>

(平成27年度 インフルエンザQ&A)

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>