

使用上の注意改訂のお知らせ

鎮痛・抗炎症剤

劇薬 **アップノン錠 40 mg**

UPNON Tablets 40mg
(フルルビプロフェン錠)

製造販売元

コーアイセイ株式会社

山形市若葉町13番45号

TEL:023-622-7755

FAX:023-624-4717

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記製品の【使用上の注意】を下記のとおり自主改訂致しますので改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 改訂内容

■下線部改訂箇所■ [.....] : 自主改訂により削除

| 改訂後 | | | 改訂前 | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 【使用上の注意】 | | | 【使用上の注意】 | | |
| 3. 相互作用 －現行のとおり－ (1) 併用禁忌 (併用しないこと) | | | 3. 相互作用 －省略－ (1) 併用禁忌 (併用しないこと) | | |
| 薬剤名等 | 臨床症状・ 措置方法 | 機序・ 危険因子 | 薬剤名等 | 臨床症状・ 措置方法 | 機序・ 危険因子 |
| エノキサシン水和物 ロメフロキサシン ロメバクト バレオン ノルフロキサシン バクシダール プルリフロキサシン スオード | 類似化合物(フルルビプロフェン アキセチル)で併用により痙攣があらわれたとの報告がある。 併用により痙攣があらわれるおそれがある。 | ニューキノロン系抗菌剤のGABA阻害作用が併用により増強されるためと考えられる。 | エノキサシン <u>フルマーク</u> ロメフロキサシン ロメバクト バレオン ノルフロキサシン バクシダール プルリフロキサシン スオード | 類似化合物(フルルビプロフェン アキセチル)で併用により痙攣があらわれたとの報告がある。 併用により痙攣があらわれるおそれがある。 | ニューキノロン系抗菌剤のGABA阻害作用が併用により増強されるためと考えられる。 |
| (2) 併用注意 (併用に注意すること) －現行のとおり－ | | | (2) 併用注意 (併用に注意すること) －省略－ | | |
| 4. 副作用 －現行のとおり－ (1) 重大な副作用 (いずれも頻度不明) | | | 4. 副作用 －省略－ (1) 重大な副作用 (頻度不明) | | |
| 1) ショック、アナフィラキシー ：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、胸内苦悶、悪寒、冷汗、呼吸困難、四肢しびれ感、血圧低下、血管浮腫、蕁麻疹等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 | | | 1) ショック、アナフィラキシー ：ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、胸内苦悶、悪寒、冷汗、呼吸困難、四肢しびれ感、血圧低下、血管浮腫、蕁麻疹等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 | | |
| 2) ～6)：－現行のとおり－ | | | 2) ～6)：－省略－ | | |

その他の項目は現行のとおりです。

裏面へつづく

2. 改訂理由

自主改訂

なお、本件に関する改訂内容は「弊社ホームページ」(<http://www.isei-pharm.co.jp/>)にも掲載しておりますので、宜しく願い申し上げます。

本添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報 (DSU) No.258 (2017年4月発行予定) が掲載されていますので、あわせてご利用下さい。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。