2018 年 4 月

効能又は効果に関連する使用上の注意改訂のお知らせ

―― 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。――

合成セファロスポリン製剤
日本薬局方　注射用セファゾリンナトリウム

処方箋医薬品[注)]

トキオ注射用 0.25ｇ
トキオ注射用 0.5ｇ
トキオ注射用 1ｇ
トキオ注射用 2ｇ

TOKIO FOR INJECTION 0.25g ・0.5g・1g・2g

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
コーアイセイ株式会社
山形市若葉町１３番４５号
TEL:023-622-7755
FAX:023-624-4717

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、標記製品の**【効能又は効果に関連する使用上の注意】**を［**平成 30 年 3 月 27 日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安発 0327 第 1 号）**］に基づき、下記のとおり改訂致しますので、改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、一層のお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

１．改訂内容

改訂箇所［ ＿＿ ：自主改訂］

改　訂　後	改　訂　前
〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉 咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」[1)]を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。 主要文献 １）厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き	現行、記載なし

その他の項目は現行の通りです。

２．改訂理由

平成 29 年 6 月 1 日、厚生労働省健康局結核感染症課発出の、「抗微生物薬適正使用の手引き　第一版」に基づき、抗微生物薬の適正使用がなされるよう注意喚起するため「使用上の注意」の改訂を致しました。

本件に関する改訂内容は「弊社ホームページ」（http://www.isei-pharm.co.jp/）にも掲載しておりますので、宜しくお願い申し上げます。

本添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ（http：//www.pmda.go.jp/）に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（DSU）№269（2018 年 5 月発行予定）が掲載されていますので、あわせてご利用下さい。

流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干の日数が必要ですので、ご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。